1

N°. 50. Petit à vérifier dans le procès verbal 1723.

observation anathomique et patologique

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Jay vu depuis peu un homme agé de 35.
ans, affligé d'une hernie du coté gauche.
elle etoit complette, et composée de l'intestin
et de l'epiploum. le testicule gauche etoit bien
placé, le cordon des vaisseaux distiné de la
hernie, passe tres distinctement par l'aneau
des muscles du ventre; jay cherché utilement
le testicule droit, le malade me dit qu'il
n'en avoit poins de ce coté la, et que tres
souvent lors que sa desente etoit

ARC 15 d 1

entirement rentrée, son autre testicule

sortoit par le meme endroit, et dessendoit

dans la bource du costé gauche. je reduisit

sa dessente, je le fis tousser ~~et~~ le testicule

sortit et dessendit dans la bource non

si bas que le testicule qui habit

naturellement cette bource, mais a la

hauteur de son epididimes. l'aneau des

muscles du costé droit me parut fermé

au lieu que celuy du costé gauche etoit

considerablement dilaté. j'examiné le scrotum

ou je trouvé que le raphé n'etoit poins au milieu

des bourses

Comme il est naturellement pour les

separer en deux parties egales, il etoit

entierement au coté droit et la bource de

ce coté n'ayant rien a contenir n'etoit

point aparante ni marquee, au contraire la bource

gauche avoit une grande etendüe puis

quelle contenoit la dessente et deux testicules

on demende comment il est arrivé,

que les deux testicules se soient trouvez

dans la meme bource, si cela cest fait

par un vice de la premiere conformation

Comme on en voit arriver en bien d'autres

parties du corps, cela ne demende poins
dexplication: mais comme il est possible
que ~~et~~ Lhomme dont est question ait eté dabord bien conformé
on demende comment cela peut arriver
Jedis que dans létat naturel les enfants
~~en~~ en naisant nont poins ~~de~~ les testicules
dans la bource, ils sont dans la routte des
vaisseaux Spermatiques depuis la Surface
externe dela membrane interne du peritoine
jusque dans lanneau de loblique externe
plus ou moins pres de cet anneau: les

efforts, latoux, les cris les font dessendre

plustorts aux enfants qui crient moins

ils dessendent plustard : mais toujour lors

quils sont parvenus alaneau ils passent

atravers et dessendents peu apeu dans la

bource

nous en avons vu rester au dela delaneau

sans sortir nous en avons vu rester sous

lanneau cequi causent des douleurs qui

determinent a loperation qui convient a cette

maladie. nous voyons tous les jours des

personnes a qui le testicul passe et

et repasse l'aneau avec facilité

Cette structure estant telle: supposons que le testicule droit de notre malade n'ait pas peu passer par l'anneau du costé droit parce qu'il est bouché selon toutes les aparences et que poussé continuellement par les mouvements et les efforts naturels qui font dessendre les testicules il n'ait pas peu passer par l'aneau je dis qu'il aura suivit la surface externe de la membrane interne du peritoine depuis l'aine droit jusqu'a la gauche, ou il aura été pour lors dans la situation ou le testicul

4

gauche s'etoit trouvé avant que de dessendre dans la bource gauche, et qu'alors les memes causes qui ont fait passer l'anneau au premier testicule, l'ont fait passer a celuy cy, qui par les memes causes est dessendue dans la bource, non si bas que le premier soit parce que celuy cy occupoit la premiere place, soit parceque les vaisseaux de celuy la, n'ont pus prester et s'alonger ayant eu plus long chemin a parcourir

Lu par M. Petit le C. le 10 Juil. 1723.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE